





Orientierungshilfe bei Covid-19-Symptomen für Kinder <6 Jahre¹

	OHNE Risikokontakt		MIT Risikokontakt
Das Kind ... <ul style="list-style-type: none">• hat Schnupfen und/oder Halsweh und/oder leichten Husten* ohne Fieber und• ist in einem guten Allgemeinzustand. 	Das Kind ... <ul style="list-style-type: none">• hat akuten starken Husten ohne Fieber oder• hat neu aufgetretenes Fieber (> 38.0 °C) und• ist in einem guten Allgemeinzustand <p style="text-align: center;">Das Kind bleibt zu Hause.</p>		Das Kind ... <ul style="list-style-type: none">• hat neu aufgetretenes Fieber (>38.0°C) und/oder starker Husten• befindet sich in einem schlechten Allgemeinzustand 
	Das Kind hat keine anderen Covid-19-Symptome*.		Das Kind weist andere Covid-19-Symptome* auf.
	Innerhalb von 3 Tagen nimmt der starke Husten oder das Fieber deutlich ab. Das Kind ist während mind. 24h fieberfrei.	Der starke Husten oder das Fieber hält 3 Tage oder länger an. 	
			
Eltern oder erziehungsberechtigte Personen kontaktieren Ärztin/Arzt. Diese entscheiden über weiteres Vorgehen (z.B. ob Covid-19-Test durchgeführt wird). Und notwendige Massnahmen (z.B. ob und wann Kind wieder in die Bildungs- und Betreuungsinstitutionen darf).			
Falls Covid-19-Test durchgeführt wird.		Kein Covid-19-Test / Andere Diagnose und entsprechende Massnahmen	
Negativ und 24h fieberfrei 		Positiv 	
Das Kind kann die Betreuungsinstitutionen besuchen		Contact Tracing und Isolation²	

* leichtes Kratzen im Hals sowie gelegentliches Husten und/oder Räuspern

^{*} **Andere Covid-19-Symptome:** Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns. (Treten diese «anderen Covid-19-Symptome» isoliert auf, also ohne starken Husten oder neu aufgetretenes Fieber (>38,5°C), gilt das übliche Vorgehen unabhängig von Covid-19.)

¹ Basierend auf «Empfehlung zum Vorgehen bei symptomatischen Kindern unter 6 Jahren und anderen Personen, die Schulen und schul- und familienergänzenden Betreuungseinrichtungen frequentieren sowie Testindikationen für Kinder unter 6 Jahren während der Covid-19-Epidemie» von Bundesamt für Gesundheit BAG, Kinderärzte Schweiz und Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, 24.03.2021, sowie kibesuisse

² Bitte befolgen Sie die Anweisungen des BAGs bezüglich «Vorgehen bei einem positiven Testergebnis»