








Procédure à suivre pour les symptômes de covid-19 chez les enfants <6 ans¹

		SANS contact à risque		AVEC contact à risque		
L'enfant ... • a un rhume et/ou un mal de gorge et/ou une légère toux* sans fièvre , et • est en bon état général 	L'enfant ... • présente une toux aiguë sévère sans fièvre ou • a une fièvre apparue récemment (> 38.0 °C) et • est en bon état général L'enfant reste à la maison.		L'enfant ... • a une fièvre apparue récemment (>38.0°C) et/ou une forte toux • est en mauvais état général 		L'enfant ... • présente des symptômes de Covid-19 (peu importe lesquels et quelle que soit la gravité des symptômes) 	
	L'enfant n'a pas d'autres symptômes de Covid-19*.		L'enfant présente d'autres symptômes de Covid-19*.			
	En l'espace de 3 jours, la forte toux ou la fièvre grave diminue de manière significative. L'enfant n'a plus de fièvre pendant au moins 24 heures. 		La forte toux ou la fièvre dure 3 jours ou plus. 			
			Les parents ou les tuteurs légaux doivent contacter un-e médecine, lequel ou laquelle décidera de la suite de la procédure (p.ex. s'il convient d'effectuer le test Covid-19) et des mesures nécessaires (par exemple si et quand l'enfant peut retourner dans l'institution de formation et d'accueil).			
		Si le test Covid-19 est effectué.		Pas de test Covid-19/ Autre diagnostic et mesures appropriées		
* léger grattement dans la gorge et toux occasionnelle et/ou éclaircissement de la gorge		Négatif et sans fièvre pendant 24 heures. 		Positif. 		
L'enfant peut fréquenter l'institution d'accueil.		Traçage des contacts et isolement. ²				

*Autres symptômes de Covid-19: Des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales ; maux de tête ; douleurs aux membres ; perte du goût ou de l'odorat. (Si ces «autres symptômes de Covid-19» se manifestent de manière isolée, c'est-à-dire sans toux grave ni fièvre récemment apparue (>38,5 °C), la procédure habituelle s'applique indépendamment de Covid-19).

¹ Basé sur « Recommandations sur la procédure à suivre pour les enfants symptomatiques de moins de 6 ans ainsi que les autres personnes fréquentant les écoles et les structures d'accueil parascolaire/extrafamilial et indications de test chez les enfants de moins de 6 ans pendant l'épidémie de Covid-19 » de l' Office fédéral de la santé publique OFSP, Kinderärzte Schweiz [Association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire] et Société Suisse de Pédiatrie, 24.03.2021, et kibesuisse

² Veuillez suivre les instructions de l'OFSP en matière de « Procédure en cas de test positif »